

『管理栄養士国家試験受験必修キーワード集 第5版』第3刷 正誤表

女子栄養大学出版部と女子栄養大学管理栄養士国家試験対策委員会に寄せられた正誤や誤植、及び Q&A をページ順に掲載いたしました。

| 掲載日 | ページ | 行 | 誤 | 正 |
|-----------|------|--------------|---|--|
| 2012/6/15 | 44左 | 【エイコサノイド】下3行 | エイコサノイドは、n-6系ではアラキドン酸、n-3系ではジホモ- γ -リノレン酸、IPA(EPA)から体内で代謝され、生成される。 | エイコサノイドは、n-6系ではジホモ- γ -リノレン酸、アラキドン酸、n-3系ではIPA(EPA)から代謝され、生成される。 |
| 2012/7/2 | 174左 | 【個人間変動】1行 | 《個人内変動》 | 削除 |
| 2012/7/2 | 388左 | 【フィッシャー比】8行 | 通常は1.5程度、0.8以下では肝性脳症（肝性昏睡）の危険性が大となる。 | 成人のフィッシャー比は約3.0程度であるが、肝硬変非代償期では通常1.5程度が観察され、改善には分岐鎖アミノ酸製剤投与の治療がなされる。 |
| 2012/7/2 | 459左 | 【リジノアラニン】3行 | アラニン残基よりデヒドロアラニン残基が生じ、リシン残基と結合して… | シスチンやシステインなどの残基よりデヒドロアラニン残基が生じ、近傍のリシン残基と結合して… |